

Obrisak usne šupljine

Najčešće infekcije u usnoj šupljini, kod kojih je indicirana mikrobiološka pretraga jesu periodontalna bolest te ulcerativne lezije sluznice usne šupljine, osobito kod imunokompromitiranih bolesnika.

Kandidijaza je najčešći tip infekcije usne šupljine. Najčešći je uzročnik *Candida albicans*, te povremeno i druge non-*albicans* vrste (*Candida krusei* i *Candida glabrata* koje češće koloniziraju sluznicu usne šupljine).

Ukoliko se u uzorku želi potvrditi prisustvo gljivica, na uputnici treba napisati da se želi mikološka pretraga.

UZIMANJE :

Za uzimanje ovog uzorka potreban je sterilni pamučni bris s epruvetom.

1. Pažljivo očistiti promjene od sline, naslaga i plaka.
2. Brisom se čvrsto obriše promjenjeni dio sluznice. Pritom treba paziti da se ne dotakne okolna nepromjenjena sluznica. Iz periodontalnih džepova bolje je uzeti uzorak struganjem.

TRANSPORT I POHRANA UZORKA

- Bez transportnog medija na sobnoj temperaturi do 2 sata od uzimanja uzorka
- U transportnom mediju (Stuart ili Amies) na sobnoj temperaturi do 24 sata od uzimanja uzorka
- Ukoliko nema transportnog medija, manje povoljna ali prihvatljiva je opcija pohrana uzorka na +4°C do 24 sata od uzimanja uzorka

NALAZ :

Nalaz kulture na bakterije je gotov za 4 dana. Od patogenih uzročnika se izrađuje antibiogram.

Liječnik koji je uputio pacijenta može dobiti informacije o tijeku pretrage i naraslim bakterijama putem telefona 300-852.