

Perianalni otisak je metoda izbora za dijagnozu infekcije s *Enterobius vermicularis* (mala dječja glista). Odrasli uzročnici parazitiraju u ileocekalnom području debelog crijeva i rijetko se mogu naći u stolici. Oplođena ženka noću napušta crijevo i polaže jaja u ljepljivoj masi na kožu oko analnog otvora.

U perianalnom otisku se osim jaja *Enterobius vermicularis* veoma rijetko mogu naći i jajašca *Taenia solium*, *Taenia saginata* i *Schistostoma haematobium*.

UZIMANJE

1. Preporuča se da se pacijent ne pere jedan dan
2. Uzorak se uzima ujutro prije ustajanja iz kreveta
1. Pacijenta postaviti na laktove i koljena (malo dijete legnemo na krevet potrbuške)
2. Rukama se rašire gluteusi (veće dijete može i samo) i ljepljivu stranu celofanske trake dobro pritisnuti dva do tri puta na nabore kože oko anusa.
3. Celofansku traku prilijepiti natrag na predmetno staklo nastojeći da površina trake bude što ravnija (nabori i zarobljeni mjehurići zraka ometaju mikroskopiranje).
4. Predmetno staklo zamotati u mekani papir.
5. Donijeti u laboratorij tijekom dana.

Uzorci se ponavljaju tri dana uzastopce (jedan uzorak dnevno).

NALAZ

Nalaz se izdaje sutradan. Sve informacija se mogu dobiti na telefon 300 853.